

Impfplan Österreich 2015

ein Service von Sanofi Pasteur MSD

Säuglinge und Kleinkinder

Alter→ ↓Impfung	1. Lebensjahr					2. Lebensjahr					5. Jahr	6. Jahr
	7. Mo.	3. Mo.	5. Mo.	6. Mo.	7. Mo.	11. Mo.	12. Mo.	13. Mo.	14. Mo.	20.-24. Mo.		
Rotavirus (RV)	RV 2 bzw. 3, Abstand mind. 4 Wo. in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff											
Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus infl. B (HIB) Hepatitis B (HBV)		1. 6-fach	2. 6-fach					3. 6-fach frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung				
Pneumokokken (PNC)		1. PNC	2. PNC					3. PNC frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung				
Mumps Masern (MMR) Röteln								MMR 2 Impfungen Abstand mind. 4 Wo.				
Meningokokken^{1,2} FSME								1 x MEC-C			1. FSME	2. FSME
Varizellen (VZV)								VZV 2 Impfungen Abstand mind. 4, vorzugsweise 6 Wo.			3. FSME	FSME
Hepatitis A (HAV)									1. HAV	2. HAV		
Influenza (IV)³											IV jährlich	

¹ MEC-C: konjugierter MenC Impfstoff bei Erstimpfung ab dem 12. Monat nur eine Dosis (kann im 3. Monat erstmals geimpft werden, dann 2. im Abstand von min. 8 Wochen).

² MenB: -Individualimpfung ab dem vollendeten 2. Lebensmonat; Indikationsimpfung für Risikopersonen siehe Kapitel Meningokokken

³ IV: bei Kindern werden bei Erstimmunisierung (bis zum 8. Lebensjahr) 2 Impfungen mit min. 4 Wochen Abstand empfohlen.

■ Kostenfrei ■ Nicht kostenfrei ■ Indikationsimpfung (nicht kostenfrei)

Schulkinder

Alter→	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr
Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)	4-fach	nachholen					4-fach ¹		
Hepatitis B (HBV) Mumps Masern (MMR) Röteln	Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder Auffrischung (MMR Nachholen bei Ungeimpften oder nur 1x-Geimpften)								
Humane Papillomviren (HPV)²					2 x HPV (0/6 Monate)			2 x HPV ³ (0/6 Monate)	
Varizellen (VZV)					2 x VZV (wenn nicht bereits 2x geimpft oder Erkrankung durchgemacht)				
FSME Meningokokken⁴ (MEC4)					FSME		MEC4		
Influenza (IV)									IV jährlich

¹ Für Kinder, die vorher nur eine dip+Tet+IPV Impfung erhalten haben

² Die HPV Impfung im 1+1 Schema, soll so früh wie möglich, ab dem vollendeten 9. Lebensjahr (= 9. Geburtstag) begonnen werden

³ Catch-up Programm, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis

⁴ Nachholschema für MenB Individualimpfung und Indikationsimpfung für Risikopersonen siehe Kapitel Meningokokken

Erwachsene

Erwachsene mit vorliegender Grundimmunisierung gemäß den Empfehlungen*

Alter→	18.-20. Jahr	30. Jahr	40. Jahr	50. Jahr	60. Jahr	65. Jahr	70. Jahr	75. Jahr	80. Jahr
↓Impfung									usw.
Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)	alle 10 Jahre auffrischen					alle 5 Jahre auffrischen			
Humane Papillomviren (HPV)	gegebenenfalls nachholen								
Mumps Masern (MMR) Röteln	gegebenenfalls nachholen								
FSME	alle 5 Jahre auffrischen					alle 3 Jahre auffrischen			
Pneumokokken						siehe Abschnitt Pneumokokken			
Herpes Zoster (HZV)						einmalige Gabe			
Influenza (IV)						IV jährlich			

* Nachholimpfplan (siehe Kapitel Impfabstände-Nachholimpfungen) für Personen konsultieren, bei denen die Grundimmunisierung ganz oder teilweise fehlt